

**STUDIU KAP.
FAZA INIȚIALĂ**

**CAMPANIA
NAȚIONALĂ
ORIENTATĂ SPRE
ACTUALII ȘI
POTENȚIALII
CONSUMATORI
DE TUTUN**

Iunie, 2012

magenta
CONSULTING



CUPRINS:

ABREVIERI	6
SUMAR EXECUTIV	7
INTRODUCERE	11
i.1 Scopul și obiectivele.....	12
i.2 Metodologia aplicată.....	12
i.2.1 Intervievarea populației. Planul de eșantionare	12
i.2.2 Chestionarul	13
i.2.3 Cercetarea pilot.....	13
i.2.4 Intervievarea și calitatea datelor.....	13
i.2.5 Analiza datelor.....	13
i.3 Caracteristica eșantionului	14
i.4 Limite și bariere	14
CAPITOLUL I: STATUTUL DE FUMĂTOR. RENUNȚAREA LA FUMAT	15
1.1 Obiceiurile legate de fumat	16
1.2 Fumatul în trecut	17
1.3 Renunțarea la fumat.....	18
CAPITOLUL II: CONȘTIENȚIZAREA PREJUDICIILOR ADUSE SĂNĂȚĂII ÎN CAZUL EXPUNERII LA FUMATUL PASIV	23
2.1 Notorietate neasistată.....	24
2.2 Alte surse de informare despre practicile de fumat	25
CAPITOLUL III: CUNOȘTINȚE ȘI ATITUDINI	27
3.1 Gradul de conștientizare a efectelor negative ale fumatului și ale fumatului pasiv asupra sănătății	28
3.2 Gradul de îngrijorare referitoare la efectele negative ulterioare ale fumatului asupra sănătății .	29
CAPITOLUL IV: PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC AL FUMĂTORULUI	31
CAPITOLUL V: ANALIZA MULTIVARIATĂ	35
CONCLUZII	39
ANEXE	43

FIGURI:

Fig. 2C: În prezent fumați tutun?, N=1501, %	16
Fig. 2D.1: În mediu, câte țigări fumați zilnic?, N=366, %	17
Fig. 2E.1: În mediu, câte țigări fumați pe săptămână?, N=366, %	17
Fig. 2F.1: În trecut, cât de des obișnuiați să fumați?, N=1127,%	17
Fig. 2G: De cât timp ați renunțat la fumat?, N=97, %	18
Fig. 2F.2: Statutul fumătorilor, N=1501, %	18
Fig. 4A: În prezent fumați mai multe, mai puține sau același număr de țigări în comparație cu 30 de zile în urmă?, N=371, %	18
Fig. 4B: Pe parcursul ultimelor 30 de zile, cât de des...?, N= 371, %	19
Fig. 4C: În ultimele 30 de zile, înainte de a aprinde o țigară, cât de des ați întrebat persoanele din jur, dacă le deranjați în caz că fumați?, N=371, %	19
Fig. 4D: Pe parcursul ultimelor 30 de zile ați încercat să renunțați la fumat? N=371, %	20
Fig. 4F: Care dintre următoarele expresii descrie cel mai bine opinia dvs. actuală referitoare la renunțarea la fumat?, N =371, %	20
Fig. 4G.1: Care este probabilitatea că veți renunța la fumat?, N=371, %	21
Fig. 4G.1: Care este probabilitatea că veți lăsa fumatul?, N=371, %	21
Fig. 3A: Pe parcursul ultimelor 30 de zile, ați fost expus la publicitate și informații referitoare la fumat și sănătate?, %	24
Fig. 3B: Unde ați observat publicitatea sau informația dată?, N=862,%	25
Fig. 7A: În ultimele 12 luni a vorbit cineva cu Dvs. despre fumatul în locurile publice?, N=374, %	25
Fig. 7B: Cine a fost această persoană?, N= 71, %	26
Fig. 7C: În ce măsură susțineți sau sunteți împotriva campaniilor de informare a publicului, lansate de guvern, despre efectele fumatului asupra sănătății?, N=1501, %	26
Fig. 7C: În ce măsură susțineți sau sunteți împotriva campaniilor de informare a publicului, lansate de guvern, despre efectele fumatului asupra sănătății?, N=1501, %	26
Fig. 5A: În ce măsură susțineți sau vă opuneți următoarelor afirmații?, N= 1501, %	28
Fig. 5C: Din ceea ce cunoașteți, credeți că expunerea la fumul provenit de la țigara altei persoane cauzează următoarele..?, %	29
Fig. 5D: Sunteți îngrijorat(ă) și, dacă da, cât de mult, cu privire la faptul că fumatul vă va înrăutăți starea de sănătate în viitor?, %	29
Fig. 8G: Sunteți pentru sau împotriva unei legi care ar interzice fumatul în spații închise în fiecare dintre următoarele instituții publice?, %	30

TABELE:

Tabel i.1: Eșantionul general, N=1501, %	14
Tabel 2D: În mediu, câte țigări fumați zilnic/săptămânal?	16
Tabel 2G: De cât timp v-ați lăsat de fumat?, ani	17
Tabel 4A: În prezent fumați mai multe, mai puține sau același număr de țigări în comparație cu 30 de zile în urmă?, N=371	18
Tabel 4.1: Profilul socio-demografic al fumătorului în plan comparativ cu cel al unui nefumător, %	32
Tabel 4.1: Cunoștințele fumătorilor și ale nefumătorilor, în plan comparativ, cu privire la efectele negative ale fumatului asupra sănătății, din perspectiva expunerii acestora la publicitatea anti-fumat	36
Tabel 4.1: Atitudinile fumătorilor și ale nefumătorilor, în plan comparativ, cu privire la efectele negative ale fumatului asupra sănătății, din perspectiva expunerii acestora la publicitatea anti-fumat	37

ANEXE:

Anexa 1: În prezent fumați tutun?, analiză multicriterială, %	44
Anexa 2: Câte țigări fumați, în mediu, pe zi/ pe parcursul unei săptămâni?, analiză multicriterială, %	45
Anexa 3: În trecut, obișnuiți să fumați zilnic, mai puțin de o dată pe zi dau deloc?, analiză multicriterială, % ..	46
Anexa 4: Cât timp a trecut de când ați încetat să fumați?, analiză multicriterială, %	47
Anexa 5: La momentul actual dumneavoastră fumați mai mult, mai puțin sau la fel de multe țigări, în comparație cu 30 de zile în urmă?, analiză multicriterială, %	48
Anexa 6: Pe parcursul ultimelor 30 de zile cât de des – niciodată, uneori sau des, Dvs. ..?, analiză multicriterială, %	49
Anexa 7: Pe parcursul ultimelor 30 de zile, cât de des înainte de a aprinde o țigară, i-ați întrebat pe cei din jur dacă sunt împotriva sau nu ca Dvs. să fumați?, analiză multicriterială, %	50
Anexa 8: Pe parcursul ultimelor 30 de zile ați încercat să vă lăsați de fumat?, analiză multicriterială, %	51
Anexa 9: Care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine părerea Dvs. referitor la lăsatul fumatului?, analiză multicriterială, %	52
Anexa 10: Care este probabilitatea ca să lăsați fumatul?, analiză multicriterială, %	53
Anexa 11: În ultimele 30 de zile, ați văzut / observat vreo publicitate sau informație despre dauna fumatului asupra sănătății?, analiză multicriterială, %	54
Anexa 12: Unde ați văzut această publicitate sau informație?, analiză multicriterială, %	55
Anexa 13: Pe parcursul ultimelor 12 luni, a vorbit cineva cu Dvs. despre interzicerea fumatului în locurile publice?, analiză multicriterială, %	56
Anexa 14: Cine v-a vorbit despre aceasta?, analiză multicriterială, %	57
Anexa 15: Cât de mult susțineți sau sunteți împotriva campaniilor de informare efectuate de către guvern despre efectele fumatului asupra sănătății?, analiză multicriterială, %	58

ABREVIERI

Aceasta este o scurtă listă de abrevieri utilizate în raport:

- ONG** – Organizații non-guvernamentale
- PAPI** – Interviu personal pe suport de hârtie (Paper Assisted Personal Interview)
- SHS** – Fumatul pasiv (Secondhand Smoke)
- KAP** – Cunoștințe, Atitudini și Practici (Knowledge Attitudes Practices)
- SPSS** – Program statistic pentru științe sociale (Statistical Package for the Social Sciences)

SUMAR EXECUTIV

Acest raport prezintă datele colectate în urma studiului efectuat înainte de lansarea campaniei naționale anti-fumat, pe un eșantion de 1501 de respondenți din mediul rural și urban, pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada mai – iunie 2012. Datele au fost colectate prin metoda PAPI față în față, folosind metoda de eșantionare probabilistică cu pas mecanic. Raportul prezintă rezultatele-cheie ale acestui studiu.

SUMAR EXECUTIV

Statutul fumătorului. Renunțarea la fumat

- Ponderea fumătorilor: 25%, dintre care 24% fumează zilnic și 1% fumează mai rar decât zilnic.
- Statutul fumătorului: 25% - fumători actuali; 7% - foști fumători; 68% nu au fumat niciodată.
- Numărul mediu de țigări fumate: 16 pe zi sau 111 pe săptămână.
- Foști fumători: 91% dintre actualii nefumători nu au fumat nici în trecut, 6% au fumat zilnic; iar 3% mai rar decât zilnic.
- Perioada de când au lăsat fumatul: în mediu, au trecut 5.8 ani de când foștii fumători au renunțat la fumat.
- Au renunțat la fumat în ultimele 6 luni sau mai devreme: 14%.
- Numărul actual de țigări fumate comparativ cu cel de 30 de zile în urmă: 12% - mai multe; 15% - mai puține, 51% - același.
- Pe parcursul ultimelor 30 de zile:
 - ✓ 57% dintre fumători au discutat acasă despre fumat și sănătate;
 - ✓ 70% dintre fumători au meditat asupra efectului negativ al fumatului asupra stării lor de sănătate;
 - ✓ 56% dintre fumători au meditat asupra efectului negativ al fumatului asupra stării de sănătate a altor persoane;
 - ✓ 65% dintre fumători s-au gândit serios să renunțe la fumat;
 - ✓ 28% au încercat să renunțe la fumat;
 - ✓ 29% măcar uneori au cerut permisiunea persoanelor din jur să își aprindă o țigară.
- S-au gândit serios să renunțe la fumat în anul următor: 40%.
- Consideră probabilă renunțarea la fumat pentru totdeauna - 34%, iar 22% cred că au șanse de 50/50.

Conștientizarea efectelor nocive ale fumatului pasiv asupra sănătății

- Au avut acces la informații cu privire la fumat și sănătate în ultimele 30 de zile: 69% dintre fumătorii actuali; 61% dintre foștii fumători și 56% dintre nefumători.
- Sursele de informare cu privire la fumat și sănătate:
 - ✓ Fumători actuali – 73% au văzut-o pe pachetul de țigări, 53% - la TV;
 - ✓ Foști fumători – 66% la TV, iar 47% pe pachetul de țigări;
 - ✓ Nefumători – 74% la TV, 30% pe pachetul de țigări;
- Alte surse de informare utilizate per ansamblu, cu privire la fumat și sănătate:
 - ✓ Vizionarea TV: 64% dintre fumători vizionează TV zilnic, la fel ca și 70% dintre nefumători;
 - ✓ Ascultarea radioului: 32% dintre fumători ascultă radio zilnic, la fel ca și 27% dintre nefumători;
 - ✓ Internet: 43% dintre fumători folosesc Internetul zilnic, la fel ca și 46% dintre nefumători;
- Discuții despre fumatul în locuri publice în ultimele 12 luni: 19% dintre fumători (35% dintre ei au discutat cu un lucrător al ONG-urilor, 8% - cu superiorii de la locul de muncă, 54% – cu familia, prietenii, etc. (din categoria alții)).
- Opinia cu privire la campania publică anti-fumat: o susțin 48% dintre actualii fumători, 72% dintre foștii fumători și 75% dintre nefumători.

Sumar executiv

Cunoștințe și atitudini

- 66% dintre fumători admit faptul că persoanele importante pentru ei cred că nu ar trebui să fumeze.
- 61% dintre fumători consideră că și-ar îmbunătăți starea de sănătate, dacă ar renunța la fumat.
- 85% din populație sunt de acord cu faptul că fumatul dăunează grav sănătății.
- 84% din populație consideră că fumătorii nu ar trebui să expună alte persoane fumului propriei țigări.
- 80% din populație consideră fumatul pasiv ca fiind periculos.
- 80% din populație sunt de acord cu faptul că fumul de țigară provoacă boli pulmonare la copii.
- 68% din populație sunt îngrijorați de starea lor de sănătate atunci când cineva fumează lângă ei.
- 65% din populație sunt de acord că legea care interzice fumatul în încăperi va aduce beneficii sănătății publice.
- 45% din populație consideră că această lege va ajuta fumătorii să renunțe la fumat.
- 26% din populație tind să creadă că fumatul nu este dăunător, întrucât mulți fumători sunt în viață și la o vârstă înaintată.
- Efectele negative ale fumatului asupra sănătății:
 - ✓ Cancer pulmonar: 84% sunt conștienți de acest lucru (91% dintre foștii fumători și 86% dintre actualii fumători);
 - ✓ Alte boli pulmonare: 69% sunt conștienți de acest lucru (83% dintre foștii fumători și 61% dintre actualii fumători);
 - ✓ Leziuni la nivelul creierului: 59% sunt conștienți de acest lucru (69% dintre foștii fumători și 51% dintre actualii fumători);
 - ✓ Boli de inimă: 71% sunt conștienți de acest lucru (82% dintre foștii fumători și 61% dintre actualii fumători);
 - ✓ Infertilitate: 51% sunt conștienți de acest lucru (53% dintre foștii fumători și 42% dintre actualii fumători).
- Efectele negative ale fumatului pasiv asupra sănătății:
 - ✓ Cancer pulmonar la nefumători: 52% conștientizează acest fapt (55% - nefumători și 45% - fumători actuali);
 - ✓ Alte boli pulmonare la nefumători: 50% conștientizează acest fapt (53% - nefumători și 40% - fumători actuali);
 - ✓ Boli de inimă la nefumători: 45% conștientizează acest fapt (48% - nefumători și 36% - fumători actuali);
 - ✓ Boli pulmonare la copii: 57% conștientizează acest fapt (59% - nefumători și 50% - fumători actuali);
 - ✓ Nou-născuți cu o greutate sub limita normală: 51% conștientizează acest fapt (55% - nefumători și 43% - fumători actuali);
 - ✓ Infecții ale urechilor la copii: 22% conștientizează acest fapt (25% - nefumători și 16% - fumători actuali);
- Preocuparea cu privire la daunele ulterioare ale fumatului: 76% dintre actualii fumători, 58% dintre foștii fumători și 55% dintre nefumători sunt îngrijorați.

Studiul KAP. Faza inițială.

INTRODUCERE

Raportul actual se bazează pe cercetarea realizată de Magenta Consulting pentru Organizația Mondială a Sănătății.

INTRODUCERE

i.1 Scopul și obiectivele

Principalul scop al acestui proiect este de a determina nivelul cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu privire la obiceiurile legate de fumat în rândul populației din Republica Moldova. Acest raport prezintă rezultatele studiului efectuat înainte de lansarea campaniei naționale anti-fumat.

Obiectivele principale ale studiului sunt:

- Evaluarea gradului de memorare a oricărei campanii anti-fumat;
- Evaluarea fumătorilor în rol de consumatori;
- Evaluarea probabilității ca fumătorii să renunțe la fumat;
- Evaluarea probabilității ca nefumătorii să-și manifeste opinia împotriva fumatului pasiv;
- Evaluarea probabilității ca nefumătorii să întreprindă anumite acțiuni pentru a evita expunerea lor la fumatul pasiv;
- Determinarea nivelului de conștientizare a impactului negativ a fumatului, dar și a fumatului pasiv asupra sănătății;
- Determinarea nivelului de acceptare de către societate a expunerii celor din jur la fumul de țigară;
- Evaluarea nivelului de conștientizare a necesității de a se conforma politicii anti-fumat (și a unei potențiale pedepse în cazul nerespectării ei);
- Identificarea surselor de informare cu privire la daunele fumatului.

i.2 Metodologia aplicată

Această cercetare a fost realizată conform metodologiei studiilor KAP, în cadrul căreia sunt analizate cunoștințe, atitudini și practici de comunicare. Această abordare ne oferă un diagnostic al nivelului de educație al comunității, care include: cunoștințele populației – referitor la înțelegerea subiectului discutat (daunele fumatului); atitudine – referitor la empatia populației atât pentru un fenomen sau subiect, cât și pentru ideile preconceptuate despre aceste fenomene sau subiecte; practici – referitor la modul în care populația își demonstrează atitudinile și cunoștințele prin acțiunile întreprinse. Înțelegerea nivelului KAP permite inițierea procesului de conștientizare a problemei într-un mod mai eficient, conform programului de ajustare la necesitățile comunității.

Această abordare și-a demonstrat eficiența teoretică și metodologică în studii similare.

Studiul s-a bazat pe date cantitative primare. Luând în considerare scopul și obiectivele acestui studiu, metodologia aplicată în cadrul acestui proiect corespunde metodelor și tehnicilor utilizate în lumea științifică și serviciile de consultanță, aceasta fiind adaptată la specificul pieței locale.

i.2.1 Intervievarea populației. Planul de eșantionare

Datele cantitative au fost colectate prin intermediul a 1501 de interviuri față-în-față, realizate în rândul populației cu vârsta de 16-55 de ani, pe întreg teritoriul republicii, exclusiv Transnistria. Acest număr de interviuri asigură o marjă de eroare de $\pm 2\%$ la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate în perioada 25.05.2012 – 16.06.2012.

Sursa datelor pentru eșantionare o constituie Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

Caracteristica eșantionului aplicat: eșantionare probabilistică cu pas, fără aplicarea cotelor.

Introducere

La primul nivel, raioanele republicii au fost combinate pe grupuri și din cadrul acestor grupuri au fost extrase aleatoriu localitățile în care s-au efectuat interviurile, astfel fiind oferită șansă tuturor localităților să participe la sondaj. Mai mult ca atât, numărul interviurilor efectuate în fiecare grup a depins de numărul de locuitori.

A fost aplicată randomizarea pe 3 niveluri, luând în considerare grupul de raioane, localități, gospodării și respondenți:

1. La nivel de localitate – selectată aleatoriu pentru fiecare nivel după cum este descris mai sus și utilizând un tabel de numere aleatorii;
2. La nivel de gospodărie – în fiecare localitate, bazată pe trasee conform străzilor existente, proiectate în funcție de numărul de interviuri pe localitate. Selecția gospodăriei s-a bazat pe statistică și metodologie, utilizându-se tehnica rutei aleatorii;
3. La nivel de persoană/respondent – la selectarea respondentului a fost aplicată metoda ultimei zile de naștere.

i.2.2 Chestionarul

Chestionarul utilizat este caracterizat ca unul complex, care include atât întrebări închise, cât și deschise. Chestionarul a fost oferit de către client, ulterior fiind adaptat și testat de către echipa de cercetare *Magenta Consulting*, în strânsă colaborare cu beneficiarul, în corespundere cu obiectivele cercetării.

Chestionarul a fost tradus în limbile română și rusă, interviul fiind realizat în limba solicitată de respondent.

i.2.3 Cercetarea pilot

Cercetarea pilot are ca scop validarea chestionarelor. Astfel, chestionarul a fost pre-testat pe un eșantion de 10 persoane din mediul rural și urban, 7 – în limba română și 3 – în limba rusă.

i.2.4 Intervievarea și calitatea datelor

Interviurile sunt efectuate de către echipa de operatori *Magenta Consulting*, echipă care a participat în numeroase proiecte similare. La începutul proiectului, echipa de operatori a fost informată despre subiectul studiului, obiectivele acestuia și metoda de analiză a datelor. Pentru a asigura calitatea datelor, 40% din chestionare au fost verificate la telefon. Întrebările adresate în timpul verificării au fost selectate în mod aleatoriu din chestionarele completate.

i.2.5 Analiza datelor

Interpretarea datelor a fost efectuată cu ajutorul programului specializat – SPSS 18, cu interpretare statistică descriptivă și multicriterială. Fiecare domeniu de interes a fost analizat în funcție de caracteristicile eșantionului (datele demografice), care sunt prezentate în întregime sub formă de anexe, dar și sub formă de analiză în text.

Chestionarele au fost procesate prin scanare cu ajutorul softului specializat de recunoaștere, astfel excluzându-se posibilele erori umane în crearea bazei de date.

Testele de semnificație statistică au fost aplicate pentru a testa corelațiile și asocierile în dependență de tipul variabilelor analizate (Pearson's R, Eta, Sommers' d, Phi). Toate testele aplicate au utilizat aceeași scară – de la 0 la 1, unde 0 înseamnă că nu există nicio asociere/corelație între variabile, iar cu cât mai mult valoarea se apropie de 1, cu atât mai puternică este corelația/asocierea existentă. Coeficientul de semnificație arată importanța asocierii/corelației existente și trebuie să aibă o valoare mai mică de mică 0.05, pentru ca aceasta să fie semnificativă. Pentru analiza multivariată s-a aplicat regresia logistică.

Studiul KAP. Faza inițială.

i.3 Caracteristica eșantionului

Interviurile au fost efectuate față în față, în baza chestionarelor structurate. Toți operatorii au fost instruiți pentru acest proiect, iar chestionarele au fost pre-testate. Interviurile au avut loc la domiciliul respondenților. Segmentarea eșantionului în funcție de mediul de reședință (rural/urban), regiunea republicii (nord/centru/sud), vârstă și sex s-a efectuat în conformitate cu datele obținute de la Biroul Național de Statistică. Alte caracteristici ale eșantionului nu au fost determinate.

Tabel i.1: Eșantionul general, N=1501, %

		Total, N=1501	Fumători, N=374	Nefumători, N=1127
Sex	Masculin	43	84	29
	Feminin	57	16	71
Vârsta	Vârsta medie, ani	35.3	34.9	35.5
Studii	Fără studii/ Primare	8	10	7
	Secundare	47	46	48
	Superioare	43	43	44
	NR	1	1	2
Practici de fumat	Zilnic	24	95	-
	Mai rar de o dată pe zi	1	5	-
	Nefumători	75	-	100
Starea civilă	Căsătorit(ă)/ În concubinaj	62	60	62
	Celibatar(ă)	25	28	24
	Alta	10	9	11
	NR	3	2	3
Mediu	Urban	43	51	41
	Rural	57	49	59
Regiune	Nord	28	30	28
	Centru	51	53	50
	Sud	21	17	22
Total		100	100	100

i.4 Limite și bariere

Pe parcursul realizării prezentului studiu nu au fost întâlnite obstacole majore.

CAPITOLUL I:

STATUTUL DE

FUMĂTOR.

RENUNȚAREA LA


FUMAT

Acest capitol are ca scop identificarea ponderii fumătorilor în rândul populației, obiceiurile lor de a fuma și dorința de a renunța la fumat.

CAPITOLUL I: STATUTUL DE FUMĂTOR. RENUNȚAREA LA FUMAT

1.1 Obiceiurile legate de fumat

Fig. 2C: În prezent fumați tutun?, N=1501, %



Fiecare a 4-a persoană fumează zilnic și 1% fumează mai rar decât o dată pe zi. Sunt mult mai mulți bărbați care fumează decât femeii. Cea mai mare pondere a fumătorilor se regăsește în segmentul de tineri, cu vârsta între 20-34 ani. Mai mulți fumători sunt în rândurile populației urbane decât rurale. Mai mulți fumători sunt în nordul și centrul republicii decât în sud (26% și 24%, respectiv 19%). [Vezi Anexa 1.](#)

O persoană fumează pe parcursul unei zile, în mediu, 16 țigări, suma fiind de 111 pe săptămâna. Atunci când se ia în considerare valoarea mijlocie a șirului de distribuție, numărul mediu de țigări fumate zilnic este puțin mai mic – 15, iar numărul mediu de țigări pe săptămână se reduce la 105, fapt ce indică că există persoane care au indicat valori foarte mari. De asemenea, nu doar că sunt mai mulți fumători în rândul bărbaților, ci bărbații tind să și fumeze mai mult decât femeile – 15 țigări pe zi, în comparație cu 10 în cazul femeilor. Merită să menționăm faptul că nu se observă o tendință în cazul criteriului de vârstă, deși corelația dintre aceste două variabile este statistic semnificativă, dar este slabă (Pearson's $R=0.110$ la $Sig=0.038$). Fumătorii cu vârsta de 45-54 de ani fumează mai mult decât celelalte segmente de vârstă – 20 de țigări pe zi. Nu există tendințe semnificative în ceea ce privește nivelul de educație al unui fumător. Numărul de țigări fumate pe zi diferă conform statisticii în ceea ce privește starea civilă ($Eta=0.129$). Cu toate că sunt mai puțini fumători în mediul rural, aceștia fumează mai mult decât cei din mediul urban ($Eta=0.199$). [Vezi Anexa 2.](#)

Tabel 2D: În mediu, câte țigări fumați zilnic/săptămânal?

	N	Valoarea medie	Mediana
Pe parcursul unei săptămâni	366	111.2	105
Zilnic	366	15.9	15

Majoritatea fumătorilor fumează aproximativ 6-20 țigări pe zi, suma fiind de 36-140 de țigări pe săptămână. 5% fumează mai puțin de o țigară pe zi, iar 13% fumează mai mult de un pachet de țigări pe zi.

Capitolul I: Statutul de fumător. Renunțarea la fumat

Fig. 2D.1: În mediu, câte țigări fumați zilnic?, N=366, %






Fig. 2E.1: În mediu, câte țigări fumați pe săptămână?, N=366, %



1.2 Fumatul în trecut

Fig. 2F.1: În trecut, cât de des obișnuiați să fumați?, N=1127, %



Majoritatea actualilor nefumători nu au fumat deloc în trecut, 6% sunt foști fumători care fumau zilnic, iar 3% sunt foști fumători care fumau mai rar decât în fiecare zi. Mai mulți bărbați au fumat în trecut decât femeii (16%, comparativ cu 3%). Conform analizei frecvenței, ponderea maximă a celor care au fumat în trecut și nu fumează în prezent a fost înregistrată în segmentul celor cu studii superioare (ponderea celor care au fumat zilnic în trecut crește de la 1 la 8%

împreună cu creșterea nivelului de educație, testele statistice arătând că această asocieră este importantă, dar foarte slabă). Există o asocieră importantă, dar slabă între variabilele "mediul de trai" și "fumatul în trecut" – sunt mai mulți foști fumători în mediul urban (Phi=0.107 la Sig=0.002). [Vezi Anexa 3.](#)

Foștii fumători au renunțat la fumat, în mediu, cu 5.8 ani în urmă, valoarea medie fiind una mai scăzută – 4 ani, ceea ce relevă că există anumiți foști fumători care au renunțat la fumat cu mult timp în urmă. Analizând distribuția frecvenței, putem observa că 14% au renunțat la fumat recent – 6 luni sau mai puțin și alte 7% au făcut-o cu 7-12 luni în urmă. Asocieră dintre mediul și perioada de când s-a renunțat la fumat este slabă (Eta=0.145), asocieră dintre variabilele principale și nivelul de educație nu este semnificativă (Sig=0.272), același lucru poate fi remarcat referitor la criteriul regional (Sig=0.580). Nu există o diferență statistică semnificativă la nivel de sex (Eta=0.085). După cum era de așteptat, perioada de timp trecută din momentul în care o persoană a renunțat la fumat crește odată cu vârsta persoanei (Pearson's R=0.506 la Sig=0.000). [Vezi Anexa 4.](#)

Tabel 2G: De cât timp v-ați lăsat de fumat?, ani

	N	Valoarea medie	Mediana
Perioada de când s-a lăsat de fumat	97	5.8	4

Studiul KAP. Faza inițială.

Fiecare a 4-a persoană fumează în prezent (zilnic sau mai puțin de o dată pe zi) și 7% au fumat în trecut. Majoritatea nu au fumat niciodată.

Fig. 2G: De cât timp ați renunțat la fumat?, N=97, %






Fig. 2F.2: Statutul fumătorilor, N=1501, %



1.3 Renunțarea la fumat

Fiecare al 2-lea fumător fumează același număr de țigări ca și cu 30 de zile în urmă, în timp ce 12% consideră că fumează mai mult acum, iar 15% - că au fumat mai multe țigări în trecut. Nivelul de educație și criteriul regional nu prezintă diferențe semnificative în cadrul segmentelor din perspectiva variabilelor analizate. Manifestă interes faptul că singurul criteriu care arată o asociere importantă este "starea civilă" ($\Phi=0.221$ la $\text{Sig.}=0.027$). Analizând frecvențele, merită să se sublinieze că persoanele căsătorite nu și-au schimbat spre mai rău obiceiurile legate de fumat (9% dintre căsătoriți sau cei care trăiesc în concubinaj au început să fumeze mai mult, comparativ cu 16% în cazul celibatarilor). [Vezi Anexa 5.](#)

Fig. 4A: În prezent fumați mai multe, mai puține sau același număr de țigări în comparație cu 30 de zile în urmă, N=371, %



Așa cum se poate observa, există o legătură între numărul de țigări fumate și percepția fumătorului cu privire la obiceiurile comparative de a fuma – cei care fumau mai mult cu 30 de zile în urmă, cu adevărat fumau mai mult decât ceilalți (Sommers' $d = 0.221$ pentru "obiceiul de a fuma" ca variabila dependentă la nivelul semnificativ de 0.001).

Tabel 4A: În prezent fumați mai multe, mai puține sau același număr de țigări în comparație cu 30 de zile în urmă?, N=371

	Pe parcursul unei săptămâni		Zilnic	
	N	Valoarea medie	N	Valoarea medie
Mai multe țigări	46	144.7	46	20.7
Mai puține țigări	57	91.8	57	13.1
La fel de multe țigări	190	109.6	190	15.7
Greu de indicat	78	109.7	78	15.7
Total	371	111.2	371	15.9

Capitolul I: Statutul de fumător. Renunțarea la fumat

Este interesant faptul că fumătorii s-au gândit la daunele aduse de fumat lor înșiși și au luat în considerare renunțarea la fumat mai des decât au discutat aceasta acasă ori s-au gândit la daunele aduse de fumat persoanelor din jur. Se pare că cel mai deranjant este gândul despre efectele negative ale fumatului asupra stării personale de sănătate – aceasta le-a venit în minte de multe ori la 31% dintre fumători și ocazional – la 39%. Există diferențe statistice semnificative în cadrul segmentelor de fumători în dependență de starea lor civilă (cei care sunt căsătoriți tind să se gândească la daunele provocate de ei altor persoane, fumând mai des decât celibatarii - $\Phi=0.212$ la $\text{Sig}=0.007$). Există o asociere dintre vârsta respondentului și discutarea subiectului despre fumat și sănătate acasă – $\text{Eta}=0.395$. Totuși, nu se atestă o tendință clară. Această problemă pare a fi discutată mai des în familiile cu adolescenți (32%, comparativ cu 17-25% în segmentul de 20-55 ani). Aceeași asociere poate fi observată în cazul "luării în considerare a posibilelor daune ale fumatului asupra propriei persoane" ($\text{Eta}=0.367$), "luării în considerare a posibilelor daune ale fumatului asupra altor persoane" ($\text{Eta}=0.394$) și, iarăși, există o asociere între variabilele "vârstă" și dorința de a renunța la fumat ($\text{Eta}=0.336$). Nu există diferențe semnificative din punctul de vedere al sexului. Fumătorii cu studii medii și superioare tind să se gândească mai des la posibilele daune aduse de fumat persoanelor din jur decât cei care nu au studii sau au doar studii primare ($\Phi=0.227$ la $\text{Sig.}=0.024$). [Vezi Anexa 6.](#)

Fig. 4B: Pe parcursul ultimelor 30 de zile, cât de des...?, N= 371, %





Fig. 4C: În ultimele 30 de zile, înainte de a aprinde o țigară, cât de des ați întrebat persoanele din jur, dacă le deranjați în caz că fumați?, N=371, %



Jumătate dintre fumători nu au cerut niciodată permisiunea de a fuma de la persoanele din jur, și doar fiecare al 5-lea a făcut-o din când în când. 7% o fac întotdeauna sau des. Asocierea dintre variabilele "educație" și "cererea permisiunii de a fuma celor din jur" este semnificativă, dar slabă (Sommers' $d=0.133$ la $\text{Sig.}=0.004$). Vârsta, de asemenea, influențează obiceiul de a cere permisiunea de a aprinde o țigară – adolescenții și tinerii par să o facă mai des ($\text{Eta}=0.327$). Alte criterii nu prezintă asocieri semnificative.


[Vezi Anexa 7.](#)

28% dintre fumători au încercat să renunțe la fumat pe parcursul ultimelor 30 de zile. Sunt mult mai mulți dintre cei care au încercat să renunțe la fumat pe parcursul ultimelor 30 de zile în rândurile persoanelor tinere (32-53%), în timp ce persoanele cu vârstă de 30-55 de ani au înregistrat cote mai mici (20-23%). Această asociere este semnificativă din punct de vedere statistic ($\text{Eta}=0.415$). Alte criterii nu au prezentat diferențe importante.

[Vezi Anexa 8.](#)


Studiul KAP. Faza inițială.

Fig. 4D: Pe parcursul ultimelor 30 de zile ați încercat să renunțați la fumat? N=371, %



41% dintre fumătorii actuali nu intenționează să renunțe la fumat, iar alți 19% vor renunța, dar nu în următoarele 12 luni. După cum era de așteptat, cota celor care se gândesc să renunțe la fumat este mai mare în rândurile celor care au încercat să renunțe la fumat în ultimele 30 de zile - 91% comparativ cu 46%. Persoanele optimiste cu privire la obiceiul lor speră să renunțe la fumat în următoarele 12 luni. Vârsta influențează puternic intenția fumătorului de a renunța – cei mai tineri sunt mai dispuși să renunțe decât fumătorii mai în vârstă (totuși, cei care **nu intenționează** să renunțe la fumat reprezintă 16% dintre adolescenți și 46% dintre cei mai în vârstă de peste 30 de ani, Eta=0.352). Alte variabile nu au înregistrat asocieri. [Vezi Anexa 9.](#)

Fig. 4F: Care dintre următoarele expresii descrie cel mai bine opinia dvs. actuală referitoare la renunțarea la fumat?, N =371, %



Capitolul I: Statutul de fumător. Renunțarea la fumat

Analizând probabilitatea de a renunța la fumat în funcție de încercările anterioare, merită de menționat că cei care au încercat să renunțe în trecut sunt mai optimiști în ceea ce privește șansele de renunțare la fumat în viitor. Testele statistice arată că asocierea dintre aceste două variabile este una moderată și semnificativă (Sommers' d pentru "probabilitatea de a renunța" ca variabilă dependentă egalează 0.454 la nivelul de semnificație de 0.000). Variabila "vârstă" a demonstrat o influență semnificativă asupra dorinței de a renunța la fumat (16% dintre adolescenți și 38-42% dintre cei mai cu vârstă de peste 30 de ani cu siguranță nu intenționează să renunțe la fumat, $Eta=0.354$). Alte criterii nu prezintă influențe semnificative asupra variabilelor. [Vezi Anexa 10.](#)

Fig. 4G.1: Care este probabilitatea că veți renunța la fumat?, N=371, %





Fig. 4G.1: Care este probabilitatea că veți lăsa fumatul?, N=371, %



Studiul KAP. Faza inițială.

CAPITOLUL II:

CONȘTIENTIZAREA

PREJUDICIILOR

ADUSE SĂNĂTĂȚII

ÎN CAZUL EXPUNERII

LA FUMATUL PASIV


Acest capitol prezintă informații cu privire la notorietatea neasistată, precum și alte surse de informare despre efectele negative ale fumatului.

CAPITOLUL II: CONȘTIENTIZAREA PREJUDICIILOR ADUSE SĂNĂȚĂII ÎN CAZUL EXPUNERII LA FUMATUL PASIV

2.1 Notorietate neasistată

Este de remarcant faptul că ponderea persoanelor care au observat reclamele anti-fumat este mai mare în rândurile actualilor fumători sau ale celor care au fumat în trecut, comparativ cu indivizii care nu au fumat niciodată (68% și 61%, comparativ cu 56%). Asocierea acestor două variabile este semnificativă, dar destul de slabă ($\Phi=0.113$ la un nivel de semnificație de 0.000). Persoanele tinere sunt, în general, mai atente la spoturile publicitare, și în particular la reclamele/informațiile anti-fumat – 62-68% dintre persoanele tinere le-au remarcat pe parcursul ultimelor 30 de zile, comparativ cu 55-59% dintre segmentele persoanelor mai în vârstă ($Eta=0.177$). Celelalte criterii nu au influențat apariția deosebirilor majore în ceea ce privește variabila analizată. [Vezi Anexa 11.](#)


Fig. 3A: Pe parcursul ultimelor 30 de zile, ați fost expus la publicitate și informații referitoare la fumat și sănătate?, %



Capitolul II: Conștientizarea prejudiciilor aduse sănătății în cazul expunerii la fumatul pasiv

În timp ce televizorul este sursa de informare primordială cu privire la campaniile anti-fumat pentru nefumători (74% dintre nefumători și 66% pentru foștii fumători), pachetul de țigări este evident sursa pentru fumătorii actuali. Astfel 73% dintre fumătorii actuali și-au amintit de anumite mesaje anti-fumat plasate pe pachetul de țigări. Cu excepția segmentului tinerilor, cota celor care au avut acces la informațiile anti-fumat prezentate la TV a crescut de la 54% la 81%, Pearson's $R=0.120$, Sig.=0.000. Celelalte criterii nu sunt decisive pentru variabilele analizate. [Vezi Anexa 12.](#)


Fig. 3B: Unde ați observat publicitatea sau informația dată?, N=862,%



2.2 Alte surse de informare despre practicile de fumat

Pe parcursul ultimilor 12 luni, majoritatea populației nu a participat la discuții despre interzicerea fumatului în locurile publice. Se pare că există tendința oamenilor de a dezaproba fumătorii tineri și nu pe cei mai în vârstă (26-31%, comparativ cu 12-18% din segmentul persoanelor în vârstă, Eta=0.338). [Vezi Anexa 13.](#)


Fig. 7A: În ultimele 12 luni a vorbit cineva cu Dvs. despre fumatul în locurile publice?, N=374, %



Studiul KAP. Faza inițială.

Persoanele care au discutat această problemă au vorbit fie cu un lucrător medical din cadrul ONG-urilor (35%), fie cu un superior de la locul de muncă/ manager al departamentului de resurse umane - 8%. Cei care au ales opțiunea "Altcineva" au specificat rudele sau prietenii. [Vezi Anexa 14.](#)

Fig. 7B: Cine a fost această persoană?, N= 71, %



Actualii fumători sunt cei care susțin cu greu campaniile anti-fumat, această asocieră fiind semnificativă, dar slabă (Somers'd=-0.196 la Sig.=0.000). Femeile sunt mai predispuse să susțină campaniile de informare publică (Phi=0.183, Sig.=0.000). În regiunea de Sud sunt mai puține persoane care sprijină totalmente campaniile anti-fumat (33%, comparativ cu 48-50% respectiv din Centrul și Nordul țării, Phi=0.175, Sig.=0.000). [Vezi Anexa 15.](#)

Fig. 7C: În ce măsură susțineți sau sunteți împotriva campaniilor de informare a publicului, lansate de guvern, despre efectele fumatului asupra sănătății?, N=1501, %





Fig. 7C: În ce măsură susțineți sau sunteți împotriva campaniilor de informare a publicului, lansate de guvern, despre efectele fumatului asupra sănătății?, N=1501, %



CAPITOLUL III:

CUNOȘTINȚE ȘI

ATITUDINI

Al treilea capitol este dedicat evaluării cunoștințelor și a atitudinii populației referitor la efectele negative ale fumatului și ale fumatului pasiv asupra sănătății.

CAPITOLUL III: CUNOȘTIȘTE ȘI ATITUDINI

3.1 Gradul de conștientizare a efectelor negative ale fumatului și ale fumatului pasiv asupra sănătății

Populația este conștientă de faptul că fumatul reprezintă cauza unor boli grave (85% sunt de acord cu această afirmație) și consideră că fumătorii nu trebuie să expună persoanele din jur fumului provenit de la țigara aprinsă de ei (84%). 80% din populație știe că expunerea la fumul provenit de la țigara altcuiva este periculoasă pentru nefumători, dar și faptul că fumul de tutun provoacă boli respiratorii copiilor care îl inhalează. Afirmația referitoare la faptul că fumatul nu este dăunător, deoarece mulți fumători trăiesc până la vârste înaintate, nu este acceptabilă. Astfel că ¼ dintre respondenți nu au fost de acord cu ea. Există o mică speranță că legile care vor interzice fumatul în locuri publice vor ajuta fumătorii să renunțe la acest obicei (45%), iar oamenii (65%) cred că legea care interzice fumatul în încăperi va spori gradul de sănătate publică.

Fig. 5A: În ce măsură susțineți sau vă opuneți următoarelor afirmații?, N= 1501, %






Fig. 5B: Din câte cunoașteți, fumatul ar putea cauza următoarele ...?, N=1501, %



Populația este conștientă că fumatul poate cauza cancer pulmonar (84%), boli de inimă (71%) și alte boli respiratorii decât cancer (69%). Este de remarcă faptul că foștii fumători sunt mai conștienți de efectele negative ale fumatului asupra sănătății decât actualii fumători, care neglijează informațiile despre acestea sau sunt foarte puțin conștienți și, prin urmare, continuă să fumeze.

Capitolul III: Cunoștințe și atitudini

Fig. 5C: Din ceea ce cunoașteți, credeți că expunerea la fumul provenit de la țigara altei persoane cauzează următoarele..?, %




În comparație cu efectele negative ale fumatului asupra sănătății, populația cunoaște mai puțin daunele provocate de fumatul pasiv. În special, acest lucru se referă la infecțiile de urechi în rândul copiilor (22% știau că este posibil). Din nou, actualii fumători par să fie cel mai puțin conștienți (fie nu sânt destul de atenți sau nu iau în considerare) de efectele negative ale fumatului pasiv.

3.2 Gradul de îngrijorare referitoare la efectele negative ulterioare ale fumatului asupra sănătății

Fumătorii sunt mai îngrijorați de efectele fumatului decât restul populației – 75% sunt preocupați de faptul că fumatul le-ar putea afecta starea de sănătate în viitor. Asocierea dintre statutul de fumător și gradul de îngrijorare resimțit de acesta cu privire la viitor este semnificativă, însă slabă ($\Phi=0.194$ la $\text{Sig}=0.000$).


Fig. 5D: Sunteți îngrijorat(ă) și, dacă da, cât de mult, cu privire la faptul că fumatul vă va înrăutăți starea de sănătate în viitor?, %



Studiul KAP. Faza inițială.

Populația este cel mai îngrijorată de fumatul în școli, spitale, în apropierea bisericilor, în transportul public, în universități și susține totalmente legile care interzic fumatul în locurile publice.

Fig. 8G: Sunteți pentru sau împotriva unei legi care ar interzice fumatul în spații închise în fiecare dintre următoarele instituții publice?, %



CAPITOLUL IV:

PROFILUL SOCIO- DEMOGRAFIC AL FUMĂTORULUI

CAPITOLUL IV: PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC AL FUMĂTORULUI

Trebuie să remarcăm faptul că fumătorii lucrează cu precădere în aer liber (22%, comparativ cu 9% în cazul nefumătorilor), ($\chi^2 = 80.389$, Sig.=0.000). După cum era de așteptat, fumătorii sunt mult mai des expuși fumului de țigară acasă, la locul de muncă și în stradă (corespunzător Phi=0.419, Sig.=0.000; Phi=0.403, Sig.=0.000 și Phi=0.272, Sig.=0.000). Majoritatea populației care are copii este reprezentată de nefumători și această observație este semnificativă din punct de vedere statistic ($\chi^2 = 7.561$, Sig.=0.023) 61%, comparativ cu 53%.

Tabel 4.1: Profilul socio-demografic al fumătorului în plan comparativ cu cel al unui nefumător, %

		Total, N=1501	Fumător, N=374	Nefumător, N=1127
Privirea televizorului	Zilnic	68	64	70
	4-6 ori pe săptămână	9	10	9
	2-3 ori pe săptămână	9	10	9
	O dată pe săptămână	3	4	3
	Mai rar de o dată pe săptămână	4	5	4
	Niciodată	3	3	2
	Nu știu	1	1	1
	Niciun răspuns	3	4	3
Ascultarea radioului	Zilnic	28	32	27
	4-6 ori pe săptămână	7	8	7
	2-3 ori pe săptămână	10	9	11
	O dată pe săptămână	7	6	8
	Mai rar de o dată pe săptămână	11	10	11
	Niciodată	29	28	29
	Nu știu	3	3	3
	Niciun răspuns	3	3	3
Citirea ziarelor/ revistelor	Zilnic	10	8	10
	4-6 ori pe săptămână	4	3	5
	2-3 ori pe săptămână	9	9	9
	O dată pe săptămână	13	8	15
	Mai rar de o dată pe săptămână	17	17	17
	Niciodată	37	42	35
	Nu știu	7	8	6
	Niciun răspuns	4	6	3
Utilizarea internetului	Zilnic	45	43	46
	4-6 ori pe săptămână	6	5	6
	2-3 ori pe săptămână	6	7	5
	O dată pe săptămână	4	3	4
	Mai rar de o dată pe săptămână	5	5	5
	Niciodată	30	30	30
	Nu știu	2	2	2
	Niciun răspuns	3	3	3
Vizite la cinematograful	Zilnic	1	0	1
	4-6 ori pe săptămână	0	0	0
	2-3 ori pe săptămână	1	1	1
	O dată pe săptămână	2	1	2
	Mai rar de o dată pe săptămână	15	15	15
	Niciodată	67	63	68
	Nu știu	10	14	9
	Niciun răspuns	4	5	4

Capitolul IV: Profilul socio-demografic al fumătorului

		Total, N=1501	Fumător, N=374	Nefumător, N=1127
Zona de lucru	Înăuntru	27	31	26
	În aer liber	12	22	9
	Nu știu	3	6	2
	Niciun răspuns	58	41	63
Expunerea la fumul de țigară acasă	Întotdeauna	6	17	2
	Des	11	24	6
	Uneori	12	13	12
	Rar	12	16	11
	Niciodată	48	20	58
	Niciun răspuns	11	12	11
Expunerea la fumul de țigară la locul de lucru	Întotdeauna	4	13	2
	Des	7	20	3
	Uneori	11	14	10
	Rar	11	9	11
	Niciodată	28	14	32
	Niciun răspuns	39	30	42
Expunerea la fumul de țigară pe stradă	Întotdeauna	7	16	4
	Des	20	28	18
	Uneori	28	26	29
	Rar	24	12	28
	Niciodată	9	5	11
	Niciun răspuns	11	13	11
Copii în familie	Da	59	53	61
	Nu	36	42	34
	Niciun răspuns	5	5	5

Studiul KAP. Faza inițială.

CAPITOLUL V:

ANALIZA

MULTIVARIATĂ

CAPITOLUL V: ANALIZA MULTIVARIATĂ

Pentru a identifica influența accesului la publicitatea/informația cu privire la cunoștințele fumătorilor și ale nefumătorilor referitor la efectele negative ale fumatului asupra sănătății, a fost realizată o analiză de covarianță. Pentru început a fost identificată existența corelației (χ^2) dintre problemele legate de fumat și accesul la publicitate. Apoi, a fost efectuată regresia logistică pentru toate aspectele analizate, separat pentru fumători și nefumători, pentru a determina nivelul de influență al expunerii la cunoștințele despre aspectele studiate. Aspectele marcate cu asterisc (*) au înregistrat corelații semnificative, iar celelalte - nu. Celulele colorate cu roșu indică regresia semnificativă a coeficienților.

Fumătorii care au avut acces la publicitate sunt mai conștienți decât fumătorii care nu au avut acces la informații cu privire la următoarele efecte negative ale fumatului asupra sănătății: "boli respiratorii la copii", "nou-născuți cu o greutate sub limita normală la mame fumătoare", "alte boli respiratorii decât cancerul pulmonar". Nefumătorii care au avut acces la publicitate sunt mai conștienți de toate mesajele testate, cu excepția "infecțiilor la ureche" și "infertilitate".

Tabel 4.1: Cunoștințele fumătorilor și ale nefumătorilor, în plan comparativ, cu privire la efectele negative ale fumatului asupra sănătății, din perspectiva expunerii acestora la publicitatea anti-fumat

		Fumători				Nefumători							
		Pozitiv (N, %)	Negativ (N, %)	p	Raportul cotelor	Pozitiv (N, %)	Negativ (N, %)	p	Raportul cotelor				
1	Cancer pulmonar la nefumători Chi-square V=11.714, sig.=0.001												
*	Regresie logaritmică	167	45	207	55	0.530	1.152	612	54	515	46	0.000	1.620
2	Alte boli pulmonare în afară de cancer la nefumători Chi-square V=29.681, sig.=0.000												
*	Regresie logaritmică	151	40	223	60	0.120	1.435	594	53	533	47	0.000	2.054
3	Boli de inimă la nefumători Chi-square V=11.393, sig.=0.001												
*	Regresie logaritmică	136	36	238	64	0.332	1.257	540	48	587	52	0.000	1.588
4	Boli pulmonare la copii Chi-square V=25.513, sig.=0.000												
*	Regresie logaritmică	188	50	186	50	0.038	1.597	663	59	464	41	0.000	1.852
5	Nașterea copiilor cu greutate sub normă Chi-square V=16.392, sig.=0.000												
*	Regresie logaritmică	161	43	213	57	0.026	1.678	608	54	519	46	0.000	1.602
6	Cancer pulmonar Chi-square V=25.959, sig.=0.000												
*	Regresie logaritmică	292	78	82	22	0.077	1.585	972	86	155	14	0.000	2.627
7	Alte boli pulmonare în afară de cancer Chi-square V=13.032, sig.=0.000												
*	Regresie logaritmică	227	61	147	39	0.032	1.627	803	71	324	29	0.001	1.581
8	Afectează creierul Chi-square V=4.927, sig.=0.026												
*	Regresie logaritmică	189	51	185	49	0.932	0.981	702	62	425	38	0.002	1.472
9	Boli de inimă Chi-square V=6.677, sig.=0.010												
*	Regresie logaritmică	230	61	144	39	0.221	1.322	831	74	296	26	0.004	1.484
1	Infecții la ureche la copii Chi-square V=0.475, sig.=0.491												
0	Regresie logaritmică	60	16	314	84	0.905	0.965	273	24	854	76	0.223	1.188
1	Infertilitate Chi-square V=1.897, sig.=0.168												
1	Regresie logaritmică	156	42	218	58	0.589	1.131	617	55	510	45	0.066	1.249

Capitolul V: Analiza multivariată

Anunțurile plasate până acum nu au avut un impact semnificativ asupra atitudinii fumătorilor vizavi de aspectele legate de fumat studiate (toate valorile p sunt mai mari de 0.05 în cazul fumătorilor). Ca și în cazul nefumătorilor, accesul la informații a determinat o atitudine pozitivă față de interzicerea fumatului în transport ($p=0.041$ și Raportul Cotelor=1.513, ceea ce implică faptul că nefumătorii ce au fost expuși la publicitate dau dovadă de o atitudine de 1.5 ori mai pozitivă vizavi de aspectul studiat decât nefumătorii care nu au avut acces la aceste anunțuri). Aceeași tendință poate fi observată pentru următoarele aspecte: "În cazul în care fumatul ar fi interzis în următoarele locuri, ați merge mai des la restaurant", "Ați fi pentru/împotriva unei legi care interzice fumatul în apropierea bisericilor", "Ați fi pentru/împotriva unei legi care interzice fumatul în apropierea spitalelor", "Atitudinea vizavi de campaniile anti-fumat".

Tabel 4.1: Atitudinile fumătorilor și ale nefumătorilor, în plan comparativ, cu privire la efectele negative ale fumatului asupra sănătății, din perspectiva expunerii acestora la publicitatea anti-fumat

	Fumători						Nefumători					
	Pozitiv (N, %)		Negativ (N, %)		p	Raportul cotelor	Pozitiv (N, %)		Negativ (N, %)		p	Raportul cotelor
1	Fumatul o să vă afecteze sănătatea în viitor Chi-square V=4.8473, sig.=0.028											
*	Regresie logaritmică											
	119	32	255	68	0.157	1.419	406	36	721	64	0.157	1.277
2	Ați susține/ ați fi împotriva unei legi ce interzice fumatul în baruri/ localuri unde servesc băuturi Chi-square V=4.866, sig.=0.027											
*	Regresie logaritmică											
	149	40	225	60	0.683	0.911	789	70	338	30	0.297	0.872
3	Ați susține/ ați fi împotriva unei legi ce interzice fumatul în transportul public Chi-square V=3.644, sig.=0.056											
*	Regresie logaritmică											
	310	83	64	17	0.219	1.422	1019	90	108	10	0.041	1.513
4	Dacă fumatul în restaurante s-ar interzice, ați fi mai predispus să le vizitați Chi-square V=11.776, sig.=0.001											
*	Regresie logaritmică											
	47	13	327	87	0.064	2.054	317	28	810	72	0.000	1.663
5	Ați susține/ ați fi împotriva unei legi ce interzice fumatul în apropierea de biserici, case de rugăciuni, etc. Chi-square V=5.570, sig.=0.018											
*	Regresie logaritmică											
	313	84	61	16	0.219	1.432	1004	89	123	11	0.016	1.584
6	Ați susține/ ați fi împotriva unei legi ce interzice fumatul în spitale Chi-square V=3.837, sig.=0.050											
	Regresie logaritmică											
	311	83	63	17	0.184	1.465	1021	91	126	11	0.042	1.515
7	Ați susține/ ați fi împotriva unei legi ce interzice fumatul la locul de lucru Chi-square V=0.329, sig.=0.566											
	Regresie logaritmică											
	242	65	132	35	0.804	1.059	981	87	146	13	0.652	1.084
8	Ați susține/ ați fi împotriva unei legi ce interzice fumatul în școli Chi-square V=2.341, sig.=0.126											
	Regresie logaritmică											
	317	85	57	15	0.471	1.244	1030	91	97	9	0.060	1.493
9	Ați susține/ ați fi împotriva unei legi ce interzice fumatul în universități Chi-square V=0.888, sig.=0.346											
	Regresie logaritmică											
	291	78	83	22	0.382	1.259	1012	90	115	10	0.166	1.314
10	Atitudinea cu privire la campaniile anti fumat Chi-square V=0.857, sig.=0.354											
	Regresie logaritmică											
	182	49	192	51	0.729	0.925	839	74	288	26	0.010	1.425
11	Ați susține/ ați fi împotriva unei legi ce interzice fumatul în restaurante / ospătării/ localuri unde poți servi masa Chi-square V=0.586, sig.=0.444											
	Regresie logaritmică											
	234	63	140	37	0.291	1.274	923	82	204	18	0.195	1.223
12	Dacă fumatul în baruri s-ar interzice, ați fi mai predispus să le vizitați Chi-square V=3.277, sig.=0.070											
	Regresie logaritmică											
	37	10	337	90	0.581	1.239	275	24	852	76	0.014	1.418

Studiul KAP. Faza inițială.

CONCLUZII

CONCLUZII

Ca urmare a cercetărilor de referință efectuate în rândul populației, s-a evidențiat faptul că fiecare a 4-a persoană fumează, iar marea lor majoritate fumează zilnic. 7% dintre intervievați sunt foști fumători. Majoritatea actualilor fumători nu și-au schimbat obiceiurile legate de fumat pe parcursul ultimelor 30 de zile.

Trebuie remarcat că fumătorii sunt mai preocupați de starea proprie de sănătate decât a celor din jur, ceea ce s-ar putea explica parțial de faptul că în rândul fumătorilor se regăsesc un pic mai mulți celibatari decât persoane căsătorite. O treime dintre fumători se gândesc serios la posibilitatea de a renunța la fumat, iar această dorință descrește odată cu vârsta. Bărbații sunt mai indiferenți și nehotărâți cu privire la decizia de a renunța la fumat, comparativ cu femeile. Fumătorii nu sunt foarte preocupați de părerile persoanelor din jur vizavi de obiceiul lor de a fuma – majoritatea nu a cerut niciodată permisiunea de a aprinde o țigară sau nu a făcut-o decât foarte rar.

O pătrime a încercat să renunțe la fumat pe parcursul ultimelor 30 de zile. Acei care au încercat, intenționează să repete încercarea dată în următoarele 12 luni. Majoritatea dintre persoanele care nu au încercat să renunțe fie că nu intenționează să o facă, fie se gândesc să renunțe în viitor, însă nu în acest an.

Majoritatea populației a fost expusă la mesajele despre efectele negative ale fumatului asupra sănătății în ultimele 30 de zile și în cazul actualilor fumători cota este mai mare decât în cazul celorlalte două categorii – foști fumători și nefumători. Aceasta se explică parțial prin aceea că oamenii sunt de obicei mai atenți la problemele care îi privesc. Alt motiv îl constituie faptul că cea mai populară sursă de informare în cazul fumătorilor este pachetul de țigări. Televizorul reprezintă o altă sursă de informare obișnuită. Alte surse de informare ce ar putea fi utilizate pentru comunicarea cu fumătorii sunt radioul și Internetul. Cinematograful și presa scrisă sunt, în general, mai puțin populare în rândul populației locale și, în particular, în rândul fumătorilor. Billboard-urile, de asemenea, atrag atenția consumatorilor și pot constitui un mod eficient de a transmite mesajul necesar. Pe lângă sursele de informare tradiționale, oamenii sunt abordați de către superiorii lor la locul de muncă și/sau de către lucrătorii medicali din cadrul diferitor ONG-uri pentru a discuta despre interzicerea fumatului în locurile publice. Acest subiect este discutat des și în cadrul familiilor fumătorilor.

Fumătorii par să nu aprecieze mesajele anti-fumat și majoritatea dintre ei fie se opun, fie nu susțin campaniile de informare publică lansate de guvern cu privire la efectele fumatului asupra sănătății. Totodată, cei care ocazional se regăsesc în categoria fumătorilor pasivi (foști fumători și nefumători) sprijină astfel de campanii. Majoritatea este de acord cu faptul că legea care interzice fumatul în încăperi va spori gradul de sănătate publică, însă, totuși, ei nu cred că aceasta îi va ajuta pe fumători să renunțe la obiceiul dat. Trebuie menționat că cea mai mare parte a cazurilor când oamenii sunt expuși la fumul de țigară are loc în stradă (fiecare a 5-a persoană a menționat că este expusă destul de des fumului de țigară), apoi acasă (fiecare a 10-a persoană) și la serviciu (7%).

Cu toate că populația apreciază în mod pozitiv legile care interzic fumatul în spitale, în transportul public, în apropierea bisericilor, în școli și universități, și majoritatea, de asemenea, consideră interzicerea fumatului în restaurante și baruri o idee bună, aceasta nu va motiva oamenii să mănânce în locuri publice mai des. Pentru majoritatea, dorința de lua masa în oraș rămâne neschimbată.

Efectele negative ale fumatului asupra sănătății sunt cunoscute de publicul larg. Populația este conștientă de faptul că fumatul ar putea provoca cancer pulmonar, boli de inimă și alte boli respiratorii decât cancerul pulmonar. Totuși nu toți oamenii știu despre posibilitatea fumătorilor de a deveni infertili. În cazul efectelor fumatului pasiv, posibilitatea infecțiilor de urechi la copii este cel mai puțin cunoscută de populație. Per ansamblu, se poate remarca că oamenii sunt mai puțin conștienți de efectele expunerii la fumatul pasiv asupra sănătății decât cele ale fumatului obișnuit

Concluzii

Prezintă interes și faptul că actualii fumători tind să neglijeze efectele negative ale fumatului și ale fumatului pasiv, sau sunt mai puțin conștienți de el. Se pare că nefumătorii sunt cei mai îngrijorați de efectele expunerii la fumatul pasiv, în timp ce foștii fumători sunt cei mai conștienți de efectele negative ale fumatului asupra sănătății.

Toate cele 3 categorii de persoane sunt conștiente de efectele negative ale fumatului. Oamenii tind să fie sinceri cu sine și nu consideră că fumatul este un lucru bun, chiar dacă unii fumători trăiesc până la vârste înaintate.

Studiul KAP. Faza inițială.

Anexe

ANEXE

ANEXE

Anexa 1: În prezent fumați tutun?, analiză multicriterială, %

		N	Zilnic	Mai puțin de o dată pe zi	Deloc	Total
Sexul	Masculin	328	47	2	51	100
	Feminin	799	6	1	93	100
Vârsta	16-19 ani	136	12	1	88	100
	20-24 ani	152	27	2	71	100
	25-29 ani	149	34	1	65	100
	30-34 ani	118	28	2	69	100
	35-44 ani	228	19	1	79	100
	45-55 ani	344	22	1	77	100
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	77	32	2	66	100
	Gimnaziu/ Liceu	540	23	1	76	100
	Studii superioare	493	23	1	76	100
	Niciun răspuns	17	18	5	77	100
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	700	23	1	76	100
	Celibatar (/ă)	276	26	1	72	100
	Alta	119	22	1	77	100
	Niciun răspuns	32	22	0	78	100
Mediul	Urban	460	28	1	71	100
	Rural	667	20	1	78	100
Regiunea	Nord	312	26	0	73	100
	Centru	567	24	2	74	100
	Sud	248	19	1	80	100

Anexe

Anexa 2: Câte țigări fumați, în mediu, pe zi/ pe parcursul unei săptămâni?, analiză multicriterială, %

		N	Fumează pe parcursul unei săptămâni		Fumează zilnic	
			Valoarea medie	Mediana	Valoarea medie	Mediana
Sexul	Masculin	310	115.4	105	16.5	15
	Feminin	56	88.0	70	12.6	10
Vârsta	16-19 ani	19	82.5	70	11.8	10
	20-24 ani	60	102.0	105	14.6	15
	25-29 ani	79	110.2	70	15.7	10
	30-34 ani	50	111.5	133	15.9	19
	35-44 ani	57	106.8	84	15.3	12
	45-55 ani	101	125.2	133	17.9	19
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	39	109.3	105	15.6	15
	Gimnaziu/ Liceu	167	118.0	140	16.9	20
	Studii superioare	156	105.2	70	15.0	10
	Niciun răspuns	4	78.8	70	11.3	10
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	220	117.7	105	16.8	15
	Celibatar (/ă)	103	97.7	84	14.0	12
	Alta	34	115.1	105	16.4	15
	Niciun răspuns	9	92.6	84	13.2	12
Mediul	Urban	187	97.5	91	13.9	13
	Rural	179	125.5	140	17.9	20
Regiunea	Nord	114	106.2	105	15.2	15
	Centru	191	110.8	105	15.8	15
	Sud	61	121.9	140	17.4	20

Studiul KAP. Faza inițială.

Anexa 3: În trecut, obișnuiți să fumați zilnic, mai puțin de o dată pe zi dau deloc?, analiză multicriterială, %

		N	Zilnic	Mai puțin de o dată pe zi	Deloc	Total
Sexul	Masculin	328	16	6	78	100
	Feminin	799	3	2	96	100
Vârsta	16-19 ani	136	0	2	98	100
	20-24 ani	152	3	3	93	100
	25-29 ani	149	9	7	83	100
	30-34 ani	118	9	3	87	100
	35-44 ani	228	4	2	95	100
	45-55 ani	344	10	1	88	100
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	77	1	4	95	100
	Gimnaziu/ Liceu	540	6	2	92	100
	Studii superioare	493	8	4	88	100
	Niciun răspuns	17	6	0	94	100
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	700	8	3	88	100
	Celibatar (/ă)	276	4	3	93	100
	Alta	119	3	1	97	100
	Niciun răspuns	32	0	3	97	100
Mediul	Urban	460	9	4	87	100
	Rural	667	5	2	93	100
Regiunea	Nord	312	6	2	92	100
	Centru	567	8	4	88	100
	Sud	248	3	1	96	100

Anexe

Anexa 4: Cât timp a trecut de când ați încetat să fumați?, analiză multicriterială, %

		N	Timpul de când a încetat să fumeze	
			Valoarea medie	Mediana
Sexul	Masculin	67	6.1	4
	Feminin	30	5.0	4
Vârsta	16-19 ani	3	1.2	1
	20-24 ani	9	1.1	1
	25-29 ani	23	4.2	3
	30-34 ani	14	3.6	2
	35-44 ani	12	5.0	5
	45-55 ani	36	9.3	8
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	4	8.0	6
	Gimnaziu/ Liceu	40	6.5	4
	Studii superioare	53	5.0	3
	Niciun răspuns	0	-	-
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	74	6.3	4
	Celibatar (/ă)	18	3.2	2
	Alta	4	8.5	7
	Niciun răspuns	1	2.0	2
Mediul	Urban	54	5.0	3
	Rural	43	6.7	4
Regiunea	Nord	25	6.2	4
	Centru	63	5.3	4
	Sud	9	8.0	3

Studiul KAP. Faza inițială.

Anexa 5: La momentul actual dumneavoastră fumați mai mult, mai puțin sau la fel de multe țigări, în comparație cu 30 de zile în urmă?, analiză multicriterială, %

		N	Mai multe țigări	Mai puține țigări	La fel de multe țigări	Greu de indicat	Total
Sexul	Masculin	311	14	16	50	21	100
	Feminin	60	7	13	57	23	100
Vârsta	16-19 ani	19	26	21	32	21	100
	20-24 ani	62	16	18	44	23	100
	25-29 ani	79	14	19	52	15	100
	30-34 ani	52	8	13	50	29	100
	35-44 ani	59	10	10	58	22	100
	45-55 ani	100	10	14	56	20	100
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	39	13	13	56	18	100
	Gimnaziu/ Liceu	169	14	15	47	24	100
	Studii superioare	158	10	16	55	18	100
	Niciun răspuns	5	20	0	40	40	100
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	222	9	15	55	22	100
	Celibatar (/ă)	105	16	19	46	19	100
	Alta	35	26	9	43	23	100
	Niciun răspuns	9	11	0	67	22	100
Mediul	Urban	189	14	17	51	17	100
	Rural	182	10	13	51	25	100
Regiunea	Nord	113	19	16	47	18	100
	Centru	197	9	16	56	19	100
	Sud	61	10	13	43	34	100

Anexe

Anexa 6: Pe parcursul ultimelor 30 de zile cât de des – niciodată, uneori sau des, Dvs. ...?, analiză multicriterială, %

		N	Ați discutat acasă despre dauna fumatului asupra sănătății					V-ați gândit la daunele ce vi le cauzează fumatul				
			Des	Uneori	Niciodată	Nu știu	Total	Des	Uneori	Niciodată	Nu știu	Total
Sexul	Masculin	311	21	37	34	8	100	30	41	19	11	100
	Feminin	60	28	27	32	13	100	37	30	23	10	100
Vârsta	16-19 ani	19	32	47	21	0	100	58	26	16	0	100
	20-24 ani	62	21	47	29	3	100	35	39	16	10	100
	25-29 ani	79	25	30	41	4	100	30	44	18	8	100
	30-34 ani	52	17	25	38	19	100	19	40	25	15	100
	35-44 ani	59	25	36	25	14	100	29	29	24	19	100
	45-55 ani	100	18	34	37	11	100	30	42	19	9	100
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	39	21	38	36	5	100	28	41	23	8	100
	Gimnaziu/ Liceu	169	20	34	36	11	100	32	34	21	12	100
	Studii superioare	158	25	36	30	9	100	30	43	17	10	100
	Niciun răspuns	5	0	20	80	0	100	40	40	20	0	100
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	222	26	33	30	11	100	29	40	20	10	100
	Celibatar (/ă)	105	15	42	36	7	100	33	39	17	10	100
	Alta	35	23	20	51	6	100	34	31	23	11	100
	Niciun răspuns	9	0	56	33	11	100	22	33	22	22	100
Mediul	Urban	189	22	32	35	11	100	28	46	18	9	100
	Rural	182	21	38	33	7	100	34	32	21	13	100
Regiunea	Nord	113	24	42	25	10	100	33	42	13	12	100
	Centru	197	24	31	39	6	100	31	40	23	7	100
	Sud	61	11	36	34	18	100	26	30	21	23	100

		V-ați gândit la daunele ce le cauzează fumatul celor din jurul Dvs.					V-ați gândit serios să vă lăsați de fumat				
		Des	Uneori	Niciodată	Nu știu	Total	Des	Uneori	Niciodată	Nu știu	Total
Sexul	Masculin	21	36	32	11	100	31	35	22	13	100
	Feminin	22	30	35	13	100	37	27	18	18	100
Vârsta	16-19 ani	37	32	32	0	100	58	26	5	11	100
	20-24 ani	11	39	40	10	100	27	45	15	13	100
	25-29 ani	25	35	34	5	100	29	37	22	13	100
	30-34 ani	23	38	25	13	100	29	29	29	13	100
	35-44 ani	19	31	32	19	100	32	25	22	20	100
	45-55 ani	20	35	31	14	100	32	32	23	13	100
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	8	59	28	5	100	18	46	18	18	100
	Gimnaziu/ Liceu	24	30	34	12	100	33	30	24	13	100
	Studii superioare	21	37	32	11	100	33	35	18	14	100
	Niciun răspuns	20	0	40	40	100	40	20	20	20	100
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	23	40	26	12	100	31	34	20	14	100
	Celibatar (/ă)	13	36	41	10	100	31	39	16	13	100
	Alta	29	11	49	11	100	34	20	37	9	100
	Niciun răspuns	22	11	44	22	100	33	0	33	33	100
Mediul	Urban	20	35	34	11	100	30	36	20	14	100
	Rural	21	36	31	12	100	33	31	23	14	100
Regiunea	Nord	27	34	27	12	100	34	39	14	13	100
	Centru	18	38	37	7	100	32	32	25	11	100
	Sud	18	30	28	25	100	25	28	21	26	100

Studiul KAP. Faza inițială.

Anexa 7: Pe parcursul ultimelor 30 de zile, cât de des înainte de a aprinde o țigară, i-ați întrebat pe cei din jur dacă sunt împotriva sau nu ca Dvs. să fumați?, analiză multicriterială, %

		N	Întotdeauna	Des	Uneori	Rar	Niciodată	Total
Sexul	Masculin	311	2	4	24	19	51	100
	Feminin	60	8	2	8	28	53	100
Vârsta	16-19 ani	19	16	0	16	32	37	100
	20-24 ani	62	2	5	27	24	42	100
	25-29 ani	79	3	5	20	22	51	100
	30-34 ani	52	4	8	13	19	56	100
	35-44 ani	59	0	3	19	14	64	100
	45-55 ani	100	2	1	26	20	51	100
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	39	0	0	21	21	59	100
	Gimnaziu/ Liceu	169	2	4	22	14	59	100
	Studii superioare	158	4	4	22	27	42	100
	Niciun răspuns	5	0	20	20	20	40	100
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	222	1	3	24	19	52	100
	Celibatar (/ă)	105	4	3	23	21	50	100
	Alta	35	9	6	6	26	54	100
	Niciun răspuns	9	0	22	0	22	56	100
Mediul	Urban	189	5	3	20	23	49	100
	Rural	182	1	4	23	18	54	100
Regiunea	Nord	113	4	3	34	23	37	100
	Centru	197	3	4	15	18	61	100
	Sud	61	2	5	21	25	48	100

Anexe

Anexa 8: Pe parcursul ultimelor 30 de zile ați încercat să vă lăsați de fumat?, analiză multicriterială, %

		N	Da	Nu	Total
Sexul	Masculin	311	27	73	100
	Feminin	60	32	68	100
Vârsta	16-19 ani	19	53	47	100
	20-24 ani	62	35	65	100
	25-29 ani	79	32	68	100
	30-34 ani	52	21	79	100
	35-44 ani	59	20	80	100
	45-55 ani	100	23	77	100
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	39	23	77	100
	Gimnaziu/ Liceu	169	27	73	100
	Studii superioare	158	29	71	100
	Niciun răspuns	5	40	60	100
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	222	24	76	100
	Celibatar (/ă)	105	34	66	100
	Alta	35	29	71	100
	Niciun răspuns	9	33	67	100
Mediul	Urban	189	25	75	100
	Rural	182	31	69	100
Regiunea	Nord	113	25	75	100
	Centru	197	30	70	100
	Sud	61	26	74	100

Studiul KAP. Faza inițială.

Anexa 9: Care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine părerea Dvs. referitor la lăsatul fumatului?, analiză multicriterială, %

		N	Planific să las fumatul imediat	Planific să las fumatul pe parcursul următoarei luni	Planific să las fumatul în următoarele 6 luni	Planific să las fumatul în următoarele 6-12 luni	O să las fumatul ulterior, dar nu în următoarele 12 luni	Nu planific să las fumatul	Total
Sexul	Masculin	311	6	12	11	10	21	41	100
	Feminin	60	12	15	5	12	12	45	100
Vârsta	16-19 ani	19	11	37	11	5	21	16	100
	20-24 ani	62	3	15	15	15	18	35	100
	25-29 ani	79	6	19	6	6	23	39	100
	30-34 ani	52	12	6	17	6	13	46	100
	35-44 ani	59	8	2	7	15	22	46	100
	45-55 ani	100	5	12	8	10	19	46	100
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	39	5	10	5	13	21	46	100
	Gimnaziu/ Liceu	169	7	13	11	9	18	42	100
	Studii superioare	158	8	13	10	9	21	39	100
	Niciun răspuns	5	0	0	20	20	0	60	100
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	222	8	9	11	11	18	43	100
	Celibatar (/ă)	105	5	18	10	10	22	35	100
	Alta	35	6	20	6	6	20	43	100
	Niciun răspuns	9	11	0	0	11	22	56	100
Mediul	Urban	189	7	12	8	8	22	41	100
	Rural	182	6	13	12	12	16	41	100
Regiunea	Nord	113	9	11	12	11	15	42	100
	Centru	197	7	14	6	11	23	39	100
	Sud	61	2	11	18	7	16	46	100

Anexe

Anexa 10: Care este probabilitatea ca să lăsați fumatul?, analiză multicriterială, %

		N	Absolut sigur că voi lăsa fumatul	Foarte probabil	Probabil	50/ 50	Puțin probabil	Foarte puțin probabil	Cu siguranță că nu	Total
Sexul	Masculin	311	7	8	18	23	7	5	32	100
	Feminin	60	10	12	12	15	12	2	38	100
Vârsta	16-19 ani	19	11	11	26	21	16	0	16	100
	20-24 ani	62	8	8	16	35	5	5	23	100
	25-29 ani	79	13	14	13	19	10	5	27	100
	30-34 ani	52	10	4	13	27	6	2	38	100
	35-44 ani	59	3	7	17	17	3	10	42	100
	45-55 ani	100	5	9	20	15	10	3	38	100
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	39	8	5	13	13	10	3	49	100
	Gimnaziu/ Liceu	169	7	9	21	19	9	4	32	100
	Studii superioare	158	9	10	14	27	6	6	28	100
	Niciun răspuns	5	0	0	0	20	20	0	60	100
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	222	7	9	18	19	9	5	33	100
	Celibatar (/ă)	105	9	11	20	28	5	3	25	100
	Alta	35	11	3	6	17	11	6	46	100
	Niciun răspuns	9	11	0	0	22	0	0	67	100
Medi ul	Urban	189	8	9	14	22	8	6	33	100
	Rural	182	8	9	20	21	7	3	32	100
Regiunea	Nord	113	8	4	22	18	7	5	35	100
	Centru	197	8	10	14	24	8	6	31	100
	Sud	61	8	13	16	21	8	0	33	100

Studiul KAP. Faza inițială.

Anexa 11: În ultimele 30 de zile, ați văzut / observat vreo publicitate sau informație despre dauna fumatului asupra sănătății?, analiză multicriterială, %

		N	Da	Nu	Total
Sexul	Masculin	642	62	38	100
	Feminin	859	58	42	100
Vârsta	16-19 ani	155	62	38	100
	20-24 ani	214	63	37	100
	25-29 ani	228	68	32	100
	30-34 ani	170	59	41	100
	35-44 ani	288	55	45	100
	45-55 ani	369	57	43	100
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	116	47	53	100
	Gimnaziu/ Liceu	711	58	42	100
	Studii superioare	652	64	36	100
	Niciun răspuns	22	55	45	100
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	925	61	39	100
	Celibatar (/ă)	381	60	40	100
	Alta	154	51	49	100
	Niciun răspuns	41	51	49	100
Mediul	Urban	650	61	39	100
	Rural	851	59	41	100
Regiunea	Nord	426	53	47	100
	Centru	764	63	37	100
	Sud	311	60	40	100

Anexe

Anexa 12: Unde ați văzut această publicitate sau informație?, analiză multicriterială, %

		N	TV	Pe pachetul de țigări	Pe stradă / panouri stradale	Internet	Radio	Postere / broșuri / etichete	Am auzit despre acestea în familie/ de la prieteni/altcineva	Publicitate în/pe transport	În ziare, reviste	Lucrătorii medicali	Cinema	Seminare/ traininguri	Sursă religioasă (biserică, preot, confesiune)	Alta
Sexul	Masculin	389	62	56	14	11	9	4	5	4	3	2	1	1	1	2
	Feminin	485	75	33	17	14	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1
Vârsta	16-19 ani	92	70	36	14	23	4	4	5	5	2	2	1	4	2	1
	20-24 ani	132	54	48	23	18	7	8	5	3	2	2	1	2	1	2
	25-29 ani	153	69	49	25	16	10	7	5	5	2	4	3	0	1	1
	30-34 ani	100	65	42	14	18	6	5	3	5	4	1	2	0	0	0
	35-44 ani	152	66	43	13	6	9	5	7	5	5	3	2	1	1	2
	45-55 ani	245	81	41	10	6	11	3	3	2	3	3	0	1	2	1
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	54	67	37	6	11	6	4	2	0	2	0	0	2	0	0
	Gimnaziu/ Liceu	398	69	41	12	10	9	4	6	4	2	3	1	1	1	2
	Studii superioare	410	70	46	21	15	9	7	4	5	4	3	2	2	1	1
	Niciun răspuns	12	58	42	0	25	8	0	0	8	8	8	0	0	0	0
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	553	71	43	14	10	9	5	5	3	3	3	2	1	1	1
	Celibatar (/ă)	223	61	45	19	21	6	6	3	5	2	1	2	2	0	2
	Alta	79	75	39	19	10	13	6	6	6	4	6	0	3	5	0
	Niciun răspuns	19	79	42	21	21	5	0	11	16	5	5	0	0	0	0
Mediul	Urban	383	67	52	22	18	7	7	5	6	3	4	2	1	1	1
	Rural	491	71	36	11	9	10	3	4	2	3	1	1	2	1	1
Regiunea	Nord	222	70	47	14	14	4	4	4	4	2	3	1	2	1	1
	Centru	471	67	46	21	14	10	6	4	4	4	3	2	1	1	1
	Sud	181	73	30	6	7	11	4	8	3	1	3	1	1	1	1

Studiul KAP. Faza inițială.

Anexa 13: Pe parcursul ultimelor 12 luni, a vorbit cineva cu Dvs. despre interzicerea fumatului în locurile publice?, analiză multicriterială, %

		N	Da	Nu	Total
Sexul	Masculin	314	20	80	100
	Feminin	60	15	85	100
Vârsta	16-19 ani	19	26	74	100
	20-24 ani	62	31	69	100
	25-29 ani	79	15	85	100
	30-34 ani	52	12	88	100
	35-44 ani	60	17	83	100
	45-55 ani	102	18	82	100
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	39	15	85	100
	Gimnaziu/ Liceu	171	15	85	100
	Studii superioare	159	25	75	100
	Niciun răspuns	5	0	100	100
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	225	17	83	100
	Celibatar (/ă)	105	25	75	100
	Alta	35	9	91	100
	Niciun răspuns	9	33	67	100
Mediul	Urban	190	19	81	100
	Rural	184	18	82	100
Regiunea	Nord	114	19	81	100
	Centru	197	17	83	100
	Sud	63	24	76	100

Anexe

Anexa 14: Cine v-a vorbit despre aceasta?, analiză multicriterială, %

		N	Lucrătorul medical, sora medicală	Şeful la lucru / persoana responsabilă de resurse umane de la lucru	Angajatorul/ Managerul / Administratorul	Poliția	Lucrătorii hotelului	Lucrătorii cinematografului	Altcineva
Sexul	Masculin	62	37	10	5	2	2	2	50
	Feminin	9	22	0	0	0	0	0	78
Vârsta	16-19 ani	5	20	0	0	0	0	0	80
	20-24 ani	19	21	11	5	5	0	5	68
	25-29 ani	12	17	0	17	0	0	0	67
	30-34 ani	6	33	0	0	0	0	0	67
	35-44 ani	10	60	10	0	0	10	0	20
	45-55 ani	16	52	16	0	0	0	0	37
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	6	50	17	0	0	0	0	67
	Gimnaziu/ Liceu	26	38	4	4	0	4	0	50
	Studii superioare	39	31	10	5	3	0	3	54
	Niciun răspuns	0	0	0	0	0	0	0	0
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	39	46	3	5	0	3	0	46
	Celibatar (/ă)	26	23	15	0	4	0	4	65
	Alta	3	0	33	33	0	0	0	33
	Niciun răspuns	3	33	0	0	0	0	0	67
Mediul	Urban	37	38	8	3	0	0	0	59
	Rural	34	32	9	6	3	3	3	47
Regiunea	Nord	22	68	0	5	5	0	0	32
	Centru	34	29	12	6	0	3	0	56
	Sud	15	0	13	0	0	0	7	80

Anexe

Anexa 15: Cât de mult susțineți sau sunteți împotriva campaniilor de informare efectuate de către guvern despre efectele fumatului asupra sănătății?, analiză multicriterială, %

		N	Completamente susțin	Parțial susțin	Nici/nici	Parțial împotrivă	Total împotrivă	Total
Sexul	Masculin	642	36	24	32	4	4	100
	Feminin	859	53	21	22	3	2	100
Vârsta	16-19 ani	155	43	24	28	3	3	100
	20-24 ani	214	50	19	26	2	3	100
	25-29 ani	228	36	26	29	2	7	100
	30-34 ani	170	42	24	31	4	1	100
	35-44 ani	288	48	22	24	4	2	100
	45-55 ani	446	50	21	24	4	2	100
Nivelul de studii	Fără studii/ Școală primară	116	34	22	32	5	7	100
	Gimnaziu/ Liceu	711	45	23	26	4	3	100
	Studii superioare	652	49	22	24	2	2	100
	Niciun răspuns	22	32	18	50	0	0	100
Starea civilă	Căsătorit (/ă)/ Concubinaj	925	48	23	24	3	2	100
	Celibatar (/ă)	381	42	24	27	2	5	100
	Alta	154	46	16	29	5	4	100
	Niciun răspuns	41	34	12	49	5	0	100
Mediul	Urban	650	43	26	26	2	2	100
	Rural	851	48	19	26	4	3	100
Regiunea	Nord	426	50	16	28	4	2	100
	Centru	764	48	23	24	2	3	100
	Sud	311	33	29	30	6	3	100